

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «24» 05.2017 г.
№ N008384

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
БЕПАНТЕН®**

Торговое название

Бепантен®

Международное непатентованное название

Декспантенол

Лекарственная форма

Крем для наружного применения 5%

Состав

1г крема содержит:

активное вещество: декспантенол 50 мг;

вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К, спирт цетиловый, спирт стеариловый, ланолин, изопропила мирилат, пропиленгликоль, вода очищенная.

Описание

Мягкий, эластичный, гомогенный, матовый крем от белого до бледно-желтовато-белого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения гиперрубцевания. Декспантенол.

Код АТХ D03AX03

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Декспантенол быстро впитывается в кожу. Декспантенол превращается в пантотеновую кислоту и дополняет эндогенный резерв витамина. В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы; выводится в неизмененном виде – 60-70% с мочой, остальная часть через ЖКТ.

Фармакодинамика

Декспантенол является активным компонентом Бепантена, быстро превращается в клетках в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота - компонент эссенциального коэнзима А. В форме ацетилкоэнзима А играет важную роль в метаболизме клетки и улучшает регенерацию кожи и слизистой оболочки.

Показания к применению

- для ускорения (активации) процесса заживления кожи при мелких повреждениях, трещинах, ссадинах, кожных раздражениях, эритемы от пеленок, легких ожогах, хронических язвах, пролежнях, при пересадке кожи и эрозии шейки матки
- профилактика и лечение опрелостей у грудных детей
- уход за молочными железами в период кормления: лечение «сухости» и трещин сосков
- профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов, в том числе при использовании кортикостероидных препаратов.

Способ применения и дозы

Крем наносят тонким слоем один или несколько раз в день, по мере необходимости на предварительно очищенную рану или воспаленные участки кожи и слегка втирают. При необходимости можно использовать повязку.

Длительность лечения зависит от показаний и эффективности терапии.

При грудном кормлении наносить мазь на соски после каждой процедуры кормления.

При лечении повреждения слизистой шейки матки наносить один или более раз в день согласно назначению врача.

Побочное действие

- аллергический дерматит
- контактный дерматит, зуд, покраснение
- экзема, сыпь, крапивница
- раздражение кожи и появление волдырей.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия

Случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

Особые указания

Избегать попадания крема в глаза

Беременность и период грудного вскармливания

При беременности препарат следует использовать по назначению врача

При лечении трещин сосков во время кормления необходимо смыть препарат перед процедурой кормления.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами

Бепантен не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны.

Форма выпуска и упаковка

По 30 г препарата помещают в алюминиевую тубу. По 1 тубе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года.

Препарат не следует использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Наименование и страна организации-производителя

ГП Гренцах Продукционс ГмбХ, Германия

Наименование и страна держателя регистрационного удостоверения

Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) от потребителей по качеству лекарственного средства и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «Байер КАЗ»

Ул. Тимирязева, 42, бизнес-центр «Экспо-Сити», пав. 15

050057 Алматы, Республика Казахстан

Тел.: +7 701 715 78 46 – круглосуточно

Тел.: +7 727 258 80 40 (106) – в рабочее время

Факс: +7 727 244 70 01

e-mail: kz.claims@bayer.com